

17/03/2011

משרד החקלאות ופתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע



המלצות הדברה בתמרים-אביב 2011

ביטון שמעון וחיים אורן – שה"מ, מחוז העמקים ומשרד החקלאות

עש תמר הקטן

ציקדת הדבש

מחלת העיוותים והחירכון(טילביופסיס)

מחלת ריקבון התפרחות(מוגיניאלה)

הדברת עשבים

עש תמר הקטן

1. משלבים את התכשיר אלסיסטין א"ר כמקובל(נוהגים לשלב 10 גרם *אלסיסטין בק"ג אבקה מוכנה להאבקה) באופן שבכל סכב מטפלים גם בתפרחות שטופלו בפעם הקודמת.
2. משלבים 200 גרם *ביטיון (BT) ב- 800 גרם אבקת פרחי זכר וטלק ומאביקים כנ"ל.
3. במקרה ולמרות הטיפולים הללו תפתח נגיעות בחנטים נמליץ על ריסוס משולב בטרייסר אולטרא בריכוז 0.04%-0.06% או בדורסן\דורפס בריכוז של 0.15% + אלסיסטין א"ר 0.05% .
 - חשוב ביותר לערבב היטב את התכשירים האבקתיים עם האבקה לאיבוק.

ציקדת הדבש ניזונה ממוהל התאים בהוצים ומפרישה דבש. ביצים החורפות בתוך ההוצים בוקעות בימים אלה במטעים הנגועים וע"כ מומלץ לטפל בהגמעה כעת בקונפידור ת"ר או בסייפן ת"ר במנה של 5 סמ"ק לעץ.

מחלת העיוותים והחירכון

עצים המראים סימני עיוות של הכפות, רקמות חרוכות כפחם והוצים קטנים יטפלו בטרימנגול 1%+צ'מפיון 0.5%.

מחלת ריקבון התפרחות (צפון)

מרססים את כל תפרחות הזכר בטרימנגול 1% בפריצת המתחלים וכעבור שבוע שוב.

הדברת עשבים

מומלץ טיפול בתכשירי דיורון (דיוראקס או סאנדורון ת"ר) במנה של 200 סמ"ק לדונם + תכשירי גלייפוסט (ראה פירוט למטה) בריכוז של 2% .

כמו כן מומלץ שילוב של תכשירי גליפוסאט כגון ראונדאפ ודומיו בריכוז של 1%-2% + אורורה בריכוז של 0.02% או בשילוב של אקופארט בריכוז של 0.15% .

ננצל את גשמי האביב האחרונים ונסמך טיפול לימי גשם בכדי להבטיח הצנעה והפעלה של התכשיר.

גליידר ת"ר וגליגן ידבירו עשבייה קיימת וימנעו הצצת נוספת כפוף להצנעה במים (גשם אביבי מאוחר או מי המתזים סמוך לגזע)